

រក្សាវាទ បានស្អាតសំរាប់ទីវាលដាំបន្លែ

ការការពារកុំឱ្យមានសត្វចង្រៃ និងជម្ងឺនៅលើទីវាលដាំបន្លែ

Virginia Brunton & Jeremy Badgery-Parker, Ourimbah

ប័ណ្ណព័ត៌មានមួយឈុតនេះ បានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ការណែនាំដ៏មានប្រយោជន៍ សំរាប់ជួយឱ្យលោកអ្នកប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រមបញ្ចូលការត្រួតពិនិត្យ និងការការពារដោយសន្សំសំចៃ និងឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងសត្វចង្រៃក្នុងដំណាំរបស់លោកអ្នក។ អនាម័យចំការគឺជាមូលដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងការពារ។

សត្វចង្រៃ គឺជាអតិសុខុមប្រាណដែលធ្វើឱ្យខូចខាត ឬខាតបង់ ឬនាំឱ្យមានហានិភ័យដល់ដំណាំរបស់លោកអ្នក។ ជាញឹកញាប់បំផុត មនុស្សទាំងឡាយតែងគិតថាសត្វចង្រៃគឺជាសត្វល្អិត និងចៃ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ពុំមែនសត្វល្អិត ឬចៃទាំងអស់សុទ្ធតែជាសត្វចង្រៃនោះឡើយ ហើយសត្វល្អិត និងចៃខ្លះក៏មានគុណប្រយោជន៍ ហើយជួយដល់ការគ្រប់គ្រងសត្វចង្រៃផងដែរ។ សត្វធំៗទាំងឡាយដូចជាកណ្តុរប្រេង កណ្តុរតូចៗ និងទន្សាយជាដើម ក៏ជាសត្វចង្រៃដែរ។

ចាក់តើដែលបណ្តាលឱ្យកើតជម្ងឺ គឺជាអតិសុខុមប្រាណដែលបណ្តាលឱ្យកើតជម្ងឺ។ ជម្ងឺគឺជាជំងឺណាមួយក្នុងរុក្ខជាតិដែលរារាំងការបំពេញមុខងារការលូតលាស់ និងឬការរីកចម្រើនដូចជាសត្វជាតិ។ ដើម្បីឱ្យងាយយល់ ការបោះពុម្ពផ្សាយនេះបានប្រើពាក្យ “ជម្ងឺ” ដើម្បីយោងសំដៅទៅលើជម្ងឺទាំងពីរ គឺជម្ងឺដែលបណ្តាលឱ្យកើតមានអតិសុខុមប្រាណ និងជម្ងឺដែលអតិសុខុមប្រាណបង្កើតឱ្យមាន។

រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍

គឺជារុក្ខជាតិដុះនៅតាមទីកន្លែងដែលគេពុំត្រូវ ការវា។

រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍ផ្តល់ជំរកដល់សត្វចង្រៃ និងជម្ងឺ ទៀតដែលបន្ទាប់មកអាចចូលទៅក្នុងដំណាំ ហើយនៅក្នុងស្ថានភាពខ្លះ

រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍អាចប្រណាំងប្រជែងផ្ទាល់ជាមួយដំណាំ ដើម្បីស្រូបយកទឹក និងសារធាតុចិញ្ចឹមទៀតផង។

ការកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយ និងការខាតបង់

ការចំណេញ និងទិន្នផលចំការរបស់លោកអ្នកអាចប្រសើរឡើងដោយសារការកាត់បន្ថយការខាតបង់បណ្តាលមកពីសត្វចង្រៃ ដូចជាសត្វល្អិត ចៃ ជម្ងឺ និងរុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍ឱ្យមានចំនួនតិចបំផុត។ ការអនុវត្តគ្រប់គ្រងសត្វចង្រៃដែលមានប្រសិទ្ធភាព ពេលណាបានបង្កើតហើយនោះវាទំនងជាជួយកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយលើសារធាតុគីមី និងថ្លៃពលកម្មសរុបទាំងអស់។

ការគ្រប់គ្រងការពារសត្វចង្រៃ គឺជាការរៀបចំផែនការ ការលាងសំអាត និងការដាក់ឱ្យនៅដាច់ពីគេដើម្បីបង្ការរោគ។ ការនេះតម្រូវឱ្យមានការរៀប

ចំចាត់ចែង ភាពសមស្របគ្នា និងការប្រើប្រាស់ផែនការពាក់ព័ន្ធសំរាប់ចំការរបស់លោកអ្នក។ ផែនការដែលល្អនឹងធានារ៉ាប់រងថាលោកអ្នកអាច

១) រក្សាទីវាលដាំបន្លែ និងគ្រឿងបរិក្ខារឱ្យបានស្អាត និង ២) ប្រើប្រាស់ការអនុវត្តន៍ដែលចាំបាច់ ដើម្បីបញ្ឈប់កុំឱ្យសត្វចង្រៃចូលទៅក្នុងដំណាំរបស់លោកអ្នកបាន។ ការការពារ ចំណាយតិចជាងការព្យាបាល។

ពុំមានការអនុវត្តន៍តែមួយគត់ណាមួយ ដែលអាចការពារសត្វចង្រៃបានទាំងស្រុង ដើម្បីកុំឱ្យវាធ្វើឱ្យខាតបង់ដល់ផលដំណាំ និងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកឡើយ។ មានយុទ្ធសាស្ត្រ និងជំងឺសន្សំនៃការត្រួតពិនិត្យដ៏ជាក់លាក់ ឬមធ្យោបាយផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដែលអាចប្រើនៅក្នុង និងជុំវិញចំការដើម្បីគ្រប់គ្រងលើបញ្ហាសត្វចង្រៃ។

ជំងឺសន្សំមួយៗនឹងទោរទន់ទៅរកៈ

- ការប៉ះទង្គិចផ្សេងៗគ្នា
- ប៉ះពាល់ដល់សត្វចង្រៃ និងជម្ងឺផ្សេងៗគ្នា
- មានថ្លៃចំណាយ ឬគុណប្រយោជន៍ផ្សេងៗគ្នា។

គន្លឹះដែលសំខាន់ ដើម្បីឱ្យថ្លៃចំណាយលើការគ្រប់គ្រងសត្វចង្រៃមានប្រសិទ្ធភាព គឺការរួមបញ្ចូលនូវយុទ្ធសាស្ត្រសក្តិសមបំផុត មកពីជំងឺសន្សំបំផុតដែលអាចមាន និងការបង្កើតឱ្យមានជាកម្មវិធីការពារជីវិតមាំមួន។

វិធីសាស្ត្រមបញ្ចូលការគ្រប់គ្រងលើសត្វចង្រៃ

IPM (វិធីសាស្ត្រមបញ្ចូលការគ្រប់គ្រងលើសត្វចង្រៃ) គឺជាការប្រើមធ្យោបាយច្រើនយ៉ាង ដើម្បីបង្ក្រាបសត្វចង្រៃឱ្យនៅត្រឹមកំរិតដែលអាចទ្រាំទ្របាន។ ការនេះមានន័យថា ការប្រើមធ្យោបាយច្រើនជាងមួយ ការអនុវត្តន៍ ឬវិធានការត្រួតពិនិត្យដោយរួមផ្សំគ្នា។ វាក៏មានន័យដែរថាគោលបំណងពុំមែនដើម្បីបំបាត់បញ្ហាជាប្រចាំនោះឡើយ ដោយព្រោះថាជួនកាលវាអាចមានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាង ក្នុងការទ្រាំទ្រនឹងសត្វចង្រៃមួយចំនួនតូច ឬជម្ងឺក្នុងកំរិតខ្សោយមួយ ជាជាងចំណាយប្រាក់ច្រើនដើម្បីបំបាត់បញ្ហាឱ្យបានទាំងស្រុង។

ចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំគឺ “ការរួមបញ្ចូលគ្នា”។ ការរួមផ្សំរវាង មធ្យោបាយសមរម្យ ឬការអនុវត្តន៍ដែលបានប្រើ ត្រូវដាក់ជាមួយគ្នា ដោយសមហេតុសមផលចំពោះអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

“ វិធីសាស្ត្ររួមបញ្ចូលការគ្រប់គ្រងលើសត្វចង្រៃ គឺជាការប្រើមធ្យោបាយច្រើនយ៉ាងដើម្បីបង្ក្រាបសត្វចង្រៃ ឱ្យនៅត្រឹមកំរិតដែលអាចទ្រាំទ្របាន ”

បំណុលតំបន់មានទាំង១០ដែលមាននៅក្នុងឈ្មួញ “រក្សាវាឱ្យបានស្អាតសំរាប់ ទីវាលដាំបន្លែ” ផ្តោតទៅលើការអនុវត្តន៍ការពារដែលអាចប្រតិបត្តិការ បានរហូតដល់ចំណុចនៃការអនុវត្តន៍ត្រួតពិនិត្យ ដូចជាការប្រើវិធីព្យាបាល ផ្នែកជីវសាស្ត្រ ឬដោយប្រើសារធាតុគីមីជាដើម។

តើលោកអ្នកចាប់ផ្តើមដោយរបៀបណា?

មនុស្សគ្រប់រូបអាចអនុវត្តន៍ IPM។ វាទាំងអស់នេះគឺអំពីការប្រើមធ្យោ បាយ និងការអនុវត្តន៍ផ្សេងៗគ្នាមួយចំនួនដោយរួមផ្សំគ្នា។ កន្លែងដែល សំខាន់ជាងគេ ហើយមានតម្លៃថោកបំផុតសំរាប់ចាប់ផ្តើមកិច្ចការ គឺជា មួយនឹងការការពារ – រក្សាវាឱ្យបានស្អាត។

ការរៀបចំកម្មវិធីសំរាប់ការគ្រប់គ្រងការពារដែលមានប្រសិទ្ធភាព និង តម្លៃទាប៖

- ដឹងពីរបៀបយ៉ាងណា និងនៅកន្លែងណាដែលបញ្ហាកើតឡើង។
- ប្រើប្រាស់ការអនុវត្តន៍ឱ្យបានច្រើនបំផុត តាមលទ្ធភាពធ្វើបានដើម្បី កាត់បន្ថយហានិភ័យ ដោយសារការកើតឡើងយ៉ាងទាន់ហាននៃសត្វ ល្អិតចង្រៃ និងជម្ងឺក្នុងដំណាំរបស់លោកអ្នក។
- ធ្វើការវាយតម្លៃលើហានិភ័យ កើតឡើងដោយសារសត្វចង្រៃនីមួយៗ ហើយប្រើព័ត៌មាននេះ ដើម្បីរៀបចំផែនការឱ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ បំផុត សំរាប់ប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រការពារទាំងអស់ដែលលោកអ្នក អាចធ្វើបាន។

“ ប្រើមធ្យោបាយ និងការអនុវត្តន៍ឱ្យបានច្រើនបំផុត តាមលទ្ធភាពធ្វើបាន ”

ការវាយតម្លៃលើហានិភ័យ និងការរៀបចំផែនការ ផ្តល់ឱ្យលោកអ្នកនូវ ពេលវេលាដើម្បីរៀបចំ និងការពារ ឬយ៉ាងហោចណាស់កំរិតការខូចខាត និងថ្លៃចំណាយលើសត្វចង្រៃ និងជម្ងឺ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកពុំបានអនុវត្ត អនាម័យល្អ និងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រការពារទេ វានឹងមានការពិបាកច្រើនជា ប្រចាំ និងអស់ថ្លៃចំណាយច្រើន ដើម្បីឱ្យអាចគ្រប់គ្រងលើបញ្ហាសត្វចង្រៃ ណាមួយ។

យ៉ាងតិចណាស់មានការអនុវត្តន៍គ្រប់គ្រងសំខាន់ៗចំនួន១០យ៉ាង ដែល ចាំបាច់ត្រូវប្រើក្នុងគ្រប់ចំការនីមួយៗ។ បើទោះបីជាលោកអ្នកពុំធ្វើអ្វីផ្សេង ទៀតក៏ដោយ សូមធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះ៖

១. ការរំលែកមើលសត្វចង្រៃ និងជម្ងឺត្រូវចាត់ចែងធ្វើជាទម្លាប់ដើម្បីឱ្យ បានច្បាស់ប្រាកដថាមានការរកឃើញទាន់ពេល និងការសម្គាល់ ដឹងបញ្ហាបានត្រឹមត្រូវ។
២. ត្រូវប្រើព័ត៌មានអំពីការពិនិត្យតាមដានដំណាំ សំរាប់ធ្វើការសម្រេច ចិត្តទាំងឡាយ មានរួមទាំងការព្យាបាលដោយជាតិគីមី ខាងជីវ សាស្ត្រ ដំណាំទាំងមូល និងកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។
៣. ត្រូវបញ្ជូនចេញសត្វល្អិតដែលពុំស្គាល់ ឬរក្សាជាតិដែលមានភាព សញ្ញាជម្ងឺ ដើម្បីសម្គាល់ឱ្យបានដឹង។
៤. ត្រូវរក្សាកន្លែងផលិតភោគផលដំណាំ និងចំការដែលនៅជុំវិញកុំឱ្យ មានរុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍ដុះ។
៥. កន្លែងដាំដុះគឺនៅក្នុងតំបន់ “ស្អាត” ដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យនៅដាច់ ពីតំបន់ “ខាងក្រៅ” ចំការ ដើម្បីបង្ការកុំឱ្យឆ្លងរោគ។
៦. ត្រូវដាក់កូនរុក្ខជាតិតូចៗទាំងអស់ឱ្យនៅដាច់ពីគេ ដើម្បីបង្ការកុំឱ្យ ឆ្លងរោគ រំលែកមើល ហើយកុំឱ្យមានសត្វចង្រៃ និងជម្ងឺ មុននឹង ដាំបណ្តុះកូនរុក្ខជាតិតូចៗ។
៧. ត្រូវដាំគ្រាប់ពូជ ឬកូនរុក្ខជាតិតូចៗនៅក្នុងកន្លែងដាំបណ្តុះស្អាត ដែលពុំមានដាំដំណាំអម្បូរដូចគ្នានឹងដំណាំឆ្នាំមុន (ឬនាមកនូវជម្ងឺ ដុះស្លឹក ដែលជារឿយៗបង្កឡើងតាមដីដូចជា sclerotinia ជាដើម)។
៨. ដាំបណ្តុះដំណាំចាស់ៗនៅក្នុងដីជាបន្តាន់ បន្ទាប់ពីការច្រូតកាត់ ប្រមូលផល ឬបានបោះបង់ចោល។
៩. សកម្មភាពរបស់មនុស្ស ឬត្រាក់ទ័រត្រូវមានតិចបំផុត នៅពេលស្លឹក ដំណាំវាលើស ជាពិសេសនៅពេលដែលដំណាំបង្ហាញឱ្យឃើញនូវ សញ្ញានៃជម្ងឺដុះស្លឹក ឬជម្ងឺចាក់កើតនៅលើស្លឹក។
១០. ត្រូវរៀបគ្រោងសកម្មភាពទាំងឡាយ ក្នុងដំណាំដែលមានសត្វចង្រៃ តិចតួចបំផុត មុននឹងធ្វើកិច្ចការក្នុងដំណាំដែលមានសត្វចង្រៃច្រើន។

ការទទួលស្គាល់៖ ព័ត៌មាននៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយនេះ បានរៀបចំឡើងដោយ រក្សាវាឱ្យបានស្អាត – កាត់បន្ថយការចំណាយ និងការខាតបង់ក្នុងការគ្រប់គ្រង សត្វចង្រៃ និងជម្ងឺនៅក្នុងដំណាំបន្លែ និងត្រូវបានរៀបចំដោយ Badger-Parker, Jand T Burfield 2009 ជាមួយនឹងកំរិត និងឱ្យបានមកពី Sandra McDougall និង Alison Anderson ។

© រដ្ឋព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមយុទ្ធសាស្ត្រជាតិកម្ពុជា និងវិទ្យាសាស្ត្រ ប្រចាំតំបន់ និងកិច្ចប្រឹងប្រែងឆ្នាំ២០១០។ ហេតុអ្វីអាចចម្លង ចែកចាយ និងដោះស្រាយជាមួយនឹងការបោះពុម្ពផ្សាយតាមរបៀបផ្សេងៗនេះដោយសេរី ដើម្បីគោល បំណងណាមួយ តែត្រូវតែរក្សាក្នុងក្របខណ្ឌនៃការកម្រិត និងវិទ្យាសាស្ត្រ ប្រចាំតំបន់

ISSN 1832-6668

ការប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ៖ ព័ត៌មាននៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយនេះ គឺសំអាងលើ ចំណេះដឹង និងការយល់ដឹងនៅក្នុងពេលកំពុងសរសេរ (ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២)។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ដោយសារការជឿនលឿនផ្នែកចំណេះដឹង អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបាន រំលឹកអំពីសេចក្តីត្រូវការដើម្បីត្រួតពិនិត្យច្បាស់ថា ព័ត៌មានដែលគេពឹងផ្អែកទៅលើ មានលក្ខណៈទាន់ពេល និងសំរាប់រំលែកមើលបច្ចុប្បន្នភាពនៃព័ត៌មានជាមួយភ្លាត់ងារ

ចុះផ្សាយដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មកែច្នៃផលិតផលកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនិរន្តរភាព ដែលជាផ្នែកមួយរបស់ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រចាំតំបន់ និងកិច្ចប្រឹងប្រែង។

Trim reference INT 12/24522

ការផលិតបំណុលព័ត៌មាននេះ និងការបកប្រែភាសាបាន ទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់កម្រៃចំណែក ពីតំណែងដែល ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់ HAL អង្គការដំណាំរុក្ខាប្រមាញ់ អូស្ត្រាលី៖ ការដោះស្រាយអំពីគុណភាព និងសុវត្ថិ ភាពនៃផលិតផល ជាមួយអ្នកដាំដុះនៃឧស្សាហកម្មបន្លែ ដែលនិយាយភាសាក្រៅពី ភាសាអង់គ្លេស ការផ្តើមគំនិតនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មបន្លែ។



Horticulture Australia